

Een blijvend welkomstbeeld voor de nieuwe generatie nucleair radiologen

Simone Jap-A-Joe

Een bijzondere prestatie verdient een blijvend symbool. Vanuit die gedachte heeft de NVNG een nieuw initiatief ontwikkeld: een bronzen welkomstbeeld dat jaarlijks wordt uitgereikt aan differentianten en tijdelijke fellows die de opleiding Nucleaire Geneeskunde succesvol hebben afgerond.

Tijdens de CWO bijeenkomst op 19 juni 2026 vond de eerste uitreiking plaats. Daarmee markeert de NVNG niet alleen het einde van een intensieve opleidingsperiode, maar vooral ook het begin van een nieuwe fase: de toetreding tot een professionele gemeenschap die zich inzet voor kwaliteit, innovatie en samenwerking binnen de nucleaire geneeskunde.

Meer dan een cadeau

Het behalen van de differentiatie of fellowship is het resultaat van jarenlange studie, toewijding en doorzettingsvermogen. Dat is een prestatie die gezien mag worden. Het welkomstbeeld is daarom meer dan een cadeau; het staat symbool voor erkenning, waardering en verbondenheid met de beroepsgroep.

Door jaarlijks hetzelfde beeld uit te reiken, ontstaat bovendien een blijvende traditie. Iedere nieuwe nucleair radioloog ontvangt hetzelfde symbool en wordt daarmee onderdeel van een groeiende generatie professionals die samen de toekomst van het vak vormgeeft.

De keuze voor Gerard Neijenhuis

Voor het ontwerp koos de NVNG

voor kunstenaar Gerard Neijenhuis, bekend om zijn bronzen beelden die zijn geïnspireerd op organische vormen en structuren uit de natuur. Zijn werk sluit op een bijzondere manier aan bij de kern van de nucleaire geneeskunde. Waar de kunstenaar verborgen structuren zichtbaar maakt in brons,

maakt de nucleaire geneeskunde onzichtbare processen in het menselijk lichaam zichtbaar. Die overeenkomst maakt zijn kunst een passend symbool voor ons vakgebied. Het beeld verbindt natuur, wetenschap en creativiteit – waarden die ook centraal staan binnen de nucleaire geneeskunde.





Vakmanschap in brons

Het vervaardigen van ieder beeld is een ambachtelijk proces. Het begint met een ontwerp in klei of was, waarna een mal wordt gemaakt en een verfijnd wasmodel ontstaat. Vervolgens wordt volgens de verlorenwasmethode de was uit de mal verwijderd en vervangen door vloeibaar brons. Tot slot wordt het beeld zorgvuldig nabewerkt, gepatineerd en gepolijst, waardoor ieder beeld een unieke en tijdloze uitstraling krijgt.

Juist dit ambacht, waarin precisie, geduld en vakmanschap samenkomen, weerspiegelt de

manier waarop ook ons vak wordt uitgeoefend.

De eerste lichting

Tijdens de CWO bijeenkomst ontvingen de differentianten en fellows die hun opleiding in 2025 hadden afgerond als eersten het nieuwe welkomstbeeld. Daarmee is een nieuwe NVNG traditie geboren. Met dit jaarlijkse welkomstbeeld wil de NVNG niet alleen een bijzondere prestatie markeren, maar ook de verbondenheid tussen generaties nucleair radiologen versterken. Het beeld herinnert de ontvangers aan een belangrijke mijlpaal in hun

loopbaan én aan hun lidmaatschap van een beroepsgroep die zich gezamenlijk inzet voor de verdere ontwikkeling van de nucleaire geneeskunde. Zo groeit ieder jaar een traditie die de geschiedenis en de toekomst van ons vak met elkaar verbindt.

Namens de NVNG feliciteren wij alle differentianten en fellows van harte met het behalen van deze bijzondere mijlpaal. Wij heten hen van harte welkom binnen onze vereniging en kijken uit naar hun bijdrage aan de toekomst van de nucleaire geneeskunde.



Interesse in een eigen beeld?

Leden die op eigen kosten een exemplaar van het NVNG-welkomstbeeld willen aanschaffen, kunnen hun interesse kenbaar maken via info@nvng.nl. De beelden worden jaarlijks geproduceerd. Op basis van de ontvangen aanmeldingen wordt een gezamenlijke bestelling geplaatst. ♦



▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Verkorte Productinformatie Xofigo® 1100 kBq/ml oplossing voor injectie

Samenstelling: *Werkzame stof:* radium Ra-223 dichloride (radium-223 dichloride, 1100 kBq/ml, op de referentiedatum overeenkomend met 0,58 ng radium-223). *Elke injectieflacon bevat 6 ml oplossing (op de referentiedatum 6,6 MBq radium-223 dichloride).* *Hulpstoffen:* Water voor injecties, natriumcitraat, natriumchloride, zoutzuur verdund. **Indicatie:** Xofigo monotherapie of in combinatie met een luteïniserend hormoon-releases hormoon (LHRH)-analoog is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd castratiere resistent prostaatscarcinoom (mCRPC), symptomatische botmetastasen en geen bekende viscerale metastasen, progressief na ten minste twee voorafgaande systemische therapielijnen voor mCRPC (andere dan LHRH-analogen), of die niet in aanmerking komen voor een beschikbare systemische mCRPC behandeling. Xofigo dient alleen te worden toegediend door personen die bevoegd zijn om met radioactieve geneesmiddelen te werken binnen een hiertoe aangewezen klinische setting. **Contra-indicaties:** Xofigo is gecontra-indiceerd in combinatie met abirateronacetaat en prednison/prednisolon. **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** De veiligheid en werkzaamheid van Xofigo in combinatie met systemische kankertherapieën, andere dan LHRH-analogen, zijn niet vastgesteld; een verhoogd risico op mortaliteit en fracturen is mogelijk. De combinatie van radium-223 met andere systemische kankertherapieën, andere dan LHRH-analogen, is niet aanbevolen. Het gebruik van Xofigo wordt niet aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met CRPC en uitsluitend asymptomatische botmetastasen. Bij volwassenen met CRPC en mild-symptomatische botmetastasen moet het voordeel van behandeling zorgvuldig worden afgewogen tegen de risico's. Behandeling met radium-223 wordt niet aanbevolen bij patiënten met een geringe mate van osteoblastische botmetastasen. Hematologische evaluatie van patiënten moet uitgevoerd worden bij aanvang van de behandeling en vóór elke volgende dosis. Indien er binnen 6 weken na de laatste toediening van Xofigo geen herstel van het absolute aantal neutrofielen (ANC) en de hemoglobine is opgetreden, ondanks het ontvangen van standaard zorg, mag de behandeling met Xofigo alleen worden voortgezet na een zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met tekenen van verminderde beenmergreserve, bijv. na een eerdere cytotoxische chemotherapie en/of radiotherapie (EBRT, *external beam radiation therapy*) of patiënten met gevorderde diffuse infiltratie van het bot (EOD4; 'superscan'). Aan patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa dient Xofigo alleen te worden toegediend na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's. Bij patiënten met onbehandelde, dreigende of al aanwezige ruggenmergcompressie dient behandeling met standaardzorg volgens klinische indicatie te worden voltooid voordat de behandeling met Xofigo wordt gestart of hervat. Voordat met radium-223 wordt gestart, moeten de botstatus en het risico op fracturen dat patiënten bij aanvang lopen (bijv. osteoporose, minder dan 6 botmetastasen, behandeling die het risico op fracturen doet toenemen, lage *Body Mass Index*) zorgvuldig worden beoordeeld en gedurende ten minste 24 maanden nauwgezet worden gevolgd. Preventieve maatregelen moeten overwogen worden alvorens behandeling met Xofigo te starten of te hervatten. Bij patiënten die bij aanvang een hoog risico op fracturen lopen, moet het voordeel van behandeling zorgvuldig worden afgewogen tegen het risico. Bij patiënten met botfracturen dienen de fracturen orthopedisch te worden gestabiliseerd voordat de behandeling met Xofigo wordt gestart of hervat. Bij patiënten die behandeld werden met bisfosfonaten en Xofigo kan een verhoogd risico op de ontwikkeling van osteonecrose van de kaak (ONJ) niet uitgesloten worden. Xofigo draagt bij aan de totale cumulatieve hoeveelheid straling waaraan patiënten op de lange termijn worden blootgesteld en kan dan ook gepaard gaan met een verhoogd risico op kanker en erfelijke defecten. Er zijn geen gevallen gemeld van Xofigo-geïnduceerde kanker in de klinische studies met een follow-upperiode tot en met drie jaar. Mannen dienen het advies te krijgen om effectieve anticonceptiemethoden te gebruiken tijdens en gedurende 6 maanden na behandeling met Xofigo. Afhankelijk van het toegediende volume bevat dit geneesmiddel tot maximaal 54 mg (2,35 mmol) natrium per dosis. **Bijwerkingen:** *Zeer vaak:* trombocytopenie, diarree, braken, misselijkheid, botfractuur; *Vaak:* neutropenie, pancytopenie, leukopenie, injectieplaatsreacties; *Soms:* lymfopenie, osteoporose. **Handelsvorm:** Injectieflacon met 6 ml oplossing voor injectie. **Nummer van de vergunning:** EU/1/13/873/001. **Vergunninghouder:** Bayer AG, 51368 Leverkusen, Duitsland. **Verdere informatie beschikbaar bij:** Bayer B.V., Siriusdreef 36, 2132 WT Hoofddorp, tel. 023 799 1000. **Afleverstatus:** UR. **Datum goedkeuring/herziening van de SmPC:** 07/2025. **Versie:** augustus 2025. Uitgebreide informatie (SmPC) is op aanvraag beschikbaar.

MA-M_RAD-NL-0013-5